

Планируемая операция:

место для визитки доктора

РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке

к хирургическому вмешательству

Дата операции:

- имплантация

- остеопластические операции

- синуслифтинг

Копию данной памятки можно скачать с сайта
www.implant-in.com, раздел **ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ**,
страница **STASKINS.HINTS**

штамп клиники

0

STASKINS.HINTS

УВАЖАЕМЫЙ ПАЦИЕНТ!

Вам предстоит хирургическая операция. Для того, чтобы она прошла максимально комфортно и безопасно, к ней необходимо должным образом подготовиться.

НЕОБХОДИМОЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ:

Вид исследования	Отметка о необходимости или выполнении:
Ортопантомография (панорамный диагностический снимок, необходим для общего ознакомления с клинической ситуацией)	
Компьютерная томография (трехмерное рентгенологическое исследование, используется для планирования и расчетов оперативного вмешательства, в т. ч. для позиционирования имплантов)	
Диагностические модели (нужны для позиционирования имплантов в сложных случаях, изготовления SetUp- и WaxUp-моделей, хирургических шаблонов и т. д.)	
Консультации смежных специалистов (при наличии сопутствующей стоматологической патологии, возможно, влияющей на результат имплантологического лечения и протезирования)	
Профессиональная гигиена полости рта (при наличии большого количества твердых и мягких зубных отложений)	

ПЕРЕД ОПЕРАЦИЕЙ:

Перед оперативным вмешательством необходимо поесть. Очень желателен легкий завтрак или ланч. Не рекомендуется приходить на операцию голодным.

ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ АНТИБИОТИКОПРОФИЛАКТИКА:

Антибиотикопрофилактика позволяет существенно снизить риск послеоперационных осложнений и уменьшить количество принимаемых после операции лекарственных средств. До операции Вам необходимо приобрести:

	Лекарственный препарат
	Кетонал (кетопрофен) _____ мг – 1 таблетка или капсула 2-3 раза в день
	Дексалгин (декскетопрофен) 25 мг – 1 таблетка 2-3 раза в день
	Нурофен (ибупрофен) _____ мг – 1 таблетка или капсула 2-3 раза в день
	Амоксиклав (Аугментин, Флемоксин) _____ мг – 1 таблетка 2-3 раза в день
	Абактал (перфлорксацин) – 1 таблетка 2 раза в день
	Сумамед (азитромицин) – 1 таблетка 1 раз в день
	Ломилан (лоратадин) 10 мг – 1 таблетка 2 раза в день
	Диазолин 0.1 г – 1 таблетка 2 раза в день

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ И ОПТИМИЗМ – ЗАЛОГ УСПЕХА!

Не забывайте об этом. Ничто так не влияет на результат лечения, как позитивное настроение и оптимизм.